
Pitch Mediant centrum voor bipolaire stoornissen

Mischa van Bendegem, verpleegkundig specialist GGZ

Toelichting

Mediant is in 2022 opnieuw gevisiteerd voor het deelnemerschap aan KenBiS. Het deelnemerschap is verlengd en in deze pitch zal Mediant de aanwezigen presenteren hoe de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis georganiseerd is binnen hun instelling, waar zij trots op zijn, wat zij kunnen delen met het kennisnetwerk en op welke wijze Mediant bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van KenBiS.

Pitch Mondriaan/PsyQ Maastricht en Heerlen

Rob Havermans, psychiater

Toelichting

Mondriaan/PsyQ Maastricht en Heerlen is in 2022 opnieuw gevisiteerd voor het deelnemerschap aan KenBiS. Het deelnemerschap is verlengd en in deze pitch zal Rob Havermans namens Mondriaan/PsyQ de aanwezigen presenteren hoe de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis georganiseerd is binnen hun instelling, waar zij trots op zijn, wat zij kunnen delen met het kennisnetwerk en op welke wijze zij bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van KenBiS.

Bipolar Lithium Imaging Scan Studie (BLISS): beeldvormend onderzoek naar lithium in de hersenen van mensen met bipolaire stoornis.

Drs. Elvira Boere, promovenda bij Leids Universitair Medisch Centrum en psychiater en onderzoeker bij PsyQ ParnassiaGroep.

Toelichting

We gaan in op de achtergrond van de dit jaar te starten BLISS-studie. Hoewel lithium op groepsniveau het middel van eerste keus is bij de behandeling van bipolaire stoornis, kan de behandelrespons op individueel niveau enorm variëren. Nieuwe ontwikkelingen in het veld van neuro-imaging stellen ons voor het eerst in staat om op gedetailleerd niveau concentraties en distributiepatronen van lithium in de hersenen te bestuderen. Het onderzoeken van correlaties tussen deze neuro-imaging data en de mate van klinische behandelrespons draagt bij aan meer kennis en een groter begrip van hoe lithium stabilisatie kan bewerkstelligen.

De effectiviteit van lamotrigine bij de bipolaire stoornis: een systematische review en meta-analyse

Dr. Richard Wesseloo, psychiater en projectleider expertiseteam bipolaire Stoornissen (GGZ Delfland), postdoctoraal onderzoeker (afdeling psychiatrie, Erasmus MC).

Toelichting

De medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis is complex, de kans op terugval is hoog en vaak is combinatietherapie nodig. Lamotrigine wordt internationaal toenemend voorgeschreven. Er zijn verschillen tussen richtlijnen wat betreft aanbevelingen voor het gebruik van lamotrigine bij de bipolaire stoornis. Doel: Een overzicht geven van de evidentie voor het gebruik van lamotrigine als acute en onderhoudsbehandeling bij de bipolaire stoornis.

De toepassing van stadiëring voor de bipolaire stoornis

Dr. Afra van der Markt, psychiater/PhD; momenteel werkzaam op de afdeling HC ggz inGeest en poli bipolaire stoornissen

Toelichting

Na het succes in de somatische geneeskunde wordt stadiëring (het indelen van een aandoening in opeenvolgende fases) nu ook steeds vaker toegepast in de psychiatrie. Voor de bipolaire stoornissen waren er al twee theoretische modellen ontwikkeld, waarvan er een gebaseerd was op de herhaling van stemmingsepisodes en de andere op inter-episodisch herstel. Deze modellen waren nog nooit getest in de praktijk. Dit is wat wij beoogden te doen in mijn promotieonderzoek. Ik vond dat de modellen goed toepasbaar zijn en ik zal vertellen hoe dit veld zich verder kan ontwikkelen. Ook zal ik vertellen wat de klinische toepasbaarheid van de modellen nu is.
